

N. 230

Anemonoides ranunculoides (L.) Holub

Sinonimi	-
Nomi comuni	Anemone gialla, Anemone falso ranucolo
Genere	<i>Anemonoides</i> Mill.
Famiglia	Ranunculaceae Juss.
Ordine	Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Febbraio-Maggio
Corologia	Europeo-Caucasica
Habitat	Sottobosco di boschi mesofili di latifoglie decidue, dal livello del mare a circa 1600 m
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Anemonoides ranunculoides (L.) Holub

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querco-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 231

***Anemonoides trifolia* (L.) Holub subsp.
*trifolia***

Sinonimi	-
Nomi comuni	Anemone trifogliata
Genere	<i>Anemonoides</i> Mill.
Famiglia	Ranunculaceae Juss.
Ordine	Ranunculales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Maggio-Giugno
Corologia	Orofita Sud Europea
Habitat	Sottobosco di boschi mesofili di latifoglie decidue, dal livello del mare a circa 1500 m
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




***Anemonoides trifolia* (L.) Holub subsp.
*trifolia***

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 232

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Sinonimi	<i>Polypodium filix-femina</i> L.; <i>Asplenium filix-foemina</i> (L.) Bernh.; <i>Athyrium filix-foemina</i> (L.) Roth; <i>Asplenium filix-femina</i> (L.) Bernh.
Nomi comuni	Felce femmina
Genere	<i>Athyrium</i> Roth
Famiglia	Athyriaceae Alston
Ordine	Polypodiales-eupolypod II Link
Forma biologica	Emicriptofite rosulate
Fioritura	Luglio-Settembre
Corologia	Subcosmopolita
Habitat	Boschi ombrosi, ambienti umidi, paludosi e alluvionali su suoli argillosi ricchi di humus, dall'altitudine del piano (rara) alla fascia montana (comune)
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Ambiguità



Athyrium filix-femina (L.) Roth

Sito	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoli
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoli
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco ripariale, in zona ombrosa, rialzata
Natura 2000	Habitat 91E0* : Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
Substrato	Suolo ricco di humus
Legit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Note	

N. 233

Bromus commutatus* Schrad. subsp. *commutatus

Sinonimi	<i>Bromus pratensis</i> Ehrh.
Nomi comuni	Forasacco allungato, Forasacco confuso
Genere	<i>Bromus</i> L.
Famiglia	Poaceae Benth.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Terofita scaposa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Europea
Habitat	Inculti, vegetazioni erbose aperte e ambienti ruderali, dal livello del mare alla fascia montana inferiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Bromus commutatus* Schrad. subsp. *commutatus

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Margine erboso di una carrareccia
Natura 2000	-
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Note	-

N. 234

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Sinonimi	<i>Dentaria bulbifera</i> L.
Nomi comuni	Dentaria minore, Dentaria bulbifera
Genere	<i>Cardamine</i> L.
Famiglia	Brassicaceae Burnett
Ordine	Brassicales Bromhead
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Aprile-Luglio
Corologia	Europea; Pontica
Habitat	Faggete, castagneti, soprattutto in radure e ai margini dei boschi, con optimum nella fascia montana
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpineti
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Sustrato	Suolo umico con buona dotazione in argilla
Legit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 235

Cardamine hirsuta L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Billeri primaticcio, Cardamine irsuta
Genere	<i>Cardamine</i> L.
Famiglia	Brassicaceae Burnett
Ordine	Brassicales Bromhead
Forma biologica	Terofita scaposa
Fioritura	Marzo-Luglio
Corologia	Cosmopolita; Stenomediterranea
Habitat	Vegetazioni ruderali, su suoli argillosi da neutri a subacidi freschi e umiferi, ricchi in composti azotati, dal livello del mare alla fascia montana
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Cardamine hirsuta L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Margine erboso di una carrareccia
Natura 2000	-
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 236

Carex alba Scop.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Carice argentina, Carice bianca
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Aprile-Giugno
Corologia	Eurosiberiana
Habitat	Ostreti ombrosi e persino nella macchia costiera, su suoli calcarei primitivi
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Carex alba Scop.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso-umifero
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 237

Carex davalliana Sm.

Sinonimi	<i>Carex scabra</i> Hoppe
Nomi comuni	Carice di Davall
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Floritura	Aprile-Giugno
Colore	Centroeuropea
Habitat	Torbiere basse alcaline, dalla fascia planiziale a quella alpina
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Carex davalliana Sm.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legitt.	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 238

Carex digitata L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Carice digitata
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Floritura	Aprile-Giugno
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Boschi di latifoglie decidue su suoli argillosi-medi e profondi, con optimum nei boschi umofili delle fasce collinare e montana inferiore
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Carex digitata L.

Provenienza	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo umifero
Legit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 239

Carex distans L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Carice a spighe distanziate
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Aprile-Giugno
Corologia	Eurimediterranea
Habitat	Prati umidi, su suoli ricchi in basi e composti azotati, ma resiste anche a periodi di disseccamento ed è alootollerante, dal livello del mare a 1300 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Carex distans L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinus betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso-umifero
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

Carex echinata Murray subsp. *echinata*

Sinonimi	<i>Carex stellulata</i> Gooden.
Nomi comuni	Carice stellare, Carice stellata
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Anfiatlantica
Habitat	Torbiere basse, sorgenti, prati umidi, su substrati prevalentemente alcalini, da 700 ai 2300 m circa, con optimum al di sopra della fascia submediterranea
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Carex echinata Murray subsp. *echinata*

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre, Via Valle di Lamen
Area protetta	-
Coordinate	UTM WGS84 32T 722414.5105352 / 46° 3' 56"N 11° 52' 33"E
Altitudine	737 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Note	Torbiera pascolata

N. 241

Carex flava L.

Sinonimi	<i>Carex flavella</i> V.J. Krecz.
Nomi comuni	Carice gialla
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Floritura	Maggio-Luglio
Corologia	Anfiatlantica
Habitat	Paludi e sorgenti con acqua ricca di calcare, da 200 a 2000 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Carex flava L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 16.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 16.06.2023
Note	-

N. 242

Carex lasiocarpa Ehrh.

Sinonimi	<i>Carex filiformis</i> Gooden. non L.
Nomi comuni	Carice a frutto pubescente, Carice a otricelli vellutati
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Floritura	Maggio-Giugno
Corologia	Circumboreale
Habitat	Bordi di stagni e torbiere, su substrati acidi, da 700 a 1800 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Carex lasiocarpa Ehrh.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5402341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7140: Torbiere di transizione e instabili
Substrato	Torba
Legit.	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 243

Carex panicea L.

Sinonimi	-
Nome comuni	Carice migliacea
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Aprile-Luglio
Corologia	Eurosiberiana
Habitat	Paludi neutro-basiche, torbiere basse e formazioni dominate da Molinia, dal livello del mare a 2200 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Carex panicea L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 244

Carex spicata Huds. subsp. *spicata*

Sinonimi	<i>Carex contigua</i> Hoppe
Nomi comuni	Carice contigua, Carice spigata
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Aprile-Luglio
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Margini e radure di boschi di latifoglie, in cespuglieti, dal livello del mare alla fascia montana
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Carex spicata Huds. subsp. *spicata*

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Prato umido
Natura 2000	Habitat 6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinia caerulea</i>)
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Note	-

N. 245

Carex sylvatica Huds.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Carice delle selve
Genere	<i>Carex</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Aprile-Maggio
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Boschi termofili di latifoglie decidue, più raramente nella macchia mediterranea, in valleciole con suolo colluviale, dal livello del mare alla fascia montana superiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Carex sylvatica Huds.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, quercio-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo umifero-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 246

Cerastium holosteoides Fr.

Sinonimi	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib.; <i>Cerastium triviale</i> Link; <i>Cerastium viscosum</i> L.; <i>Cerastium vulgatum</i> L.; <i>Cerastium vulgare</i> Hartm.; <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet; <i>Cerastium holosteoides</i> Fr. subsp. <i>triviale</i> (Link) Moschl
Nomi comuni	Peverina dei prati, Cerastio dei prati
Genere	<i>Cerastium</i> L.
Famiglia	Caryophyllaceae Juss.
Ordine	Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Aprile-Ottobre
Corologia	Cosmopolita; Eurasiatica
Habitat	Prati falciati e concimati, pascoli, campi e lungo strade di campagna, su suoli limoso-argillosi piuttosto freschi, dal livello del mare alla fascia montana superiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Cerastium holosteoides Fr.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11° 57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Prato sfalcato
Natura 2000	Habitat 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 247

Cirsium palustre (L.) Scop.

Sinonimi	<i>Carduus palustris</i> L.; <i>Cnicus palustris</i> (L.) Willd.
Nomi comuni	Cardo di palude, Cirsio di palude
Genere	<i>Cirsium</i> Mill.
Famiglia	Asteraceae Bercht. & J.Presl
Ordine	Asterales Link
Forma biologica	Emicriptofita bienne
Fioritura	Giugno-Settembre
Corologia	Eurasiatico-Paleotemperata
Habitat	Paludi, prati umidi, acquitrini, torbiere, di solito presso sorgenti o ristagni d'acqua, ma anche al margine dei boschi; dalla fascia planiziale (ove è più raro) a quella montana superiore
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Cirsium palustre (L.) Scop.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Note	-

N. 248

Cladium mariscus (L.) Pohl

Sinonimi	<i>Schoenus mariscus</i> L.; <i>Cladium serratus</i> Gilib.
Nomi comuni	Falasco
Genere	<i>Cladium</i> V. Brownie
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Maggio-luglio
Cumlogia	Subcosmopolita
Habitat	Prati umidi, paludi, torbiere neutro-basiche, a volte su substrati subsalsi, da livello del mare a 800 m circa
Protezione	Entità protetta a livello regionale
Esoticità	Autoctona



Cladium mariscus (L.) Pohl

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiere di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiere di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiere Habitat 7210*: Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Note	-

N. 249

Cladium mariscus (L.) Pohl

Sinonimi	<i>Schoenus mariscus</i> L., <i>Schoenus ferratus</i> Gilib.
Nomi comuni	Falasco
Genere	<i>Cladium</i> P. Brown
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Smal
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Subcosmopolita
Habitat	Prati umidi, paludi e torbiere neutro-basiche, a volte su suoli subsalsi, da livello del mare a 800 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Esotica




Cladium mariscus (L.) Pohl

Sito di raccolta	ITA - Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre, Torbiere di Lipoli
Area protetta	Reserva 2000 - ZSC IT3230042 Torbiere di Lipoli
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 E 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Torbiere
Natura 2000	IT3230042 (0°): Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie di <i>Caricion davallianae</i>
Substrato	Terba
Legitt.	Katia Zanatta, 14.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 14.06.2023
Note	

N. 250

***Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. subsp.
*cespitosa***

Sinonimi	-
Nomi comuni	Migliarino maggiore
Genere	<i>Deschampsia</i> P. Beauv.
Famiglia	Poaceae Barnhart
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Floritura	Giugno-Agosto
Corologia	Subcosmopolita
Habitat	Prati umidi, alle sorgenti delle paludi, lungo le sponde dei fossi e di stagni, dal livello del mare a 2600 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




***Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. subsp.
*cespitosa***

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Prato umido abbandonato
Natura 2000	Habitat 6410: Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinia caerulea</i>)
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Raccolto da	Katia Zanatta, 16.06.2023
Determinato da	Katia Zanatta, 16.06.2023
Note	-

N. 251

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs

Sinonimi	<i>Polypodium carthusianum</i> Vill.; <i>Dryopteris spinulosa</i> Watt; <i>Nephrodium spinulosum</i> Strempel, nom. illeg.
Nomi comuni	Felce certosina
Genere	<i>Dryopteris</i> Adans.
Famiglia	Dryopteridaceae Herter
Ordine	Polypodiales Link
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Giugno-Ottobre
Corologia	Circumboreale
Habitat	Boschi freschi e ombrosi, lungo le rive dei corsi d'acqua, ai margini di torbiere, stagni e paludi, dal livello del mare alla fascia subalpina
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Stato	Margine torbiera
Natura 2000	
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 29.05.2023
Note	-

N. 252

Epimedium alpinum L. subsp. *alpinum*

Sinonimi	-
Nomi comuni	Epimedio alpino
Genere	<i>Epimedium</i> L.
Famiglia	Berberidaceae Juss.
Ordine	Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Marzo-Maggio
Corologia	Europa subalpina
Habitat	Boschi di latifoglie, sui versanti di fondovalle alle faggete submontane
Protezione	Entità protetta in molti territori
Esoticità	Autoctona




Epimedium alpinum L. subsp. *alpinum*

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 28476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso-umido
Legit.	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 253

Equisetum fluviatile L.

Sinonimi	<i>Equisetum limosum</i> Ehrh.
Nomi comuni	Equiseto fluviatile
Genere	<i>Equisetum</i> L.
Famiglia	Equisetaceae de Candolle
Ordine	Equisetales Berchtold & Presl
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Maggio-Agosto
Corologia	Circumboreale
Habitat	Luoghi umidi e in acque stagnanti, dal livello del mare a circa 1800 m
Protezione	Entità protetta a livello nazionale.
Esoticità	Autoctona




Equisetum fluviatile L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 254

Equisetum palustre L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Equiseto palustre
Genere	<i>Equisetum</i> L.
Famiglia	Equisetaceae de Candolle
Ordine	Equisetales Berchtold & Presl
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Circumboreale
Habitat	Prati torbosi e in paludi acide, dal livello del mare ai 2500 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale.
Esoticità	Autoctona



Equisetum palustre L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 255

Eriophorum latifolium Hoppe

Simonimi	<i>Eriophorum polystachyum</i> L., p.p.
Nomi comuni	Pennacchi a foglie larghe, Erioforo a foglie larghe, Fiocchetti a foglie larghe
Genere	<i>Eriophorum</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Floritura	Giugno-Agosto
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Torbiere basse alcaline, prati umidi, sponde di paludi, dal livello del mare (raramente) a 2100 m circa.
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Eriophorum latifolium Hoppe

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 256

Euphorbia carniolica Jacq.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Euphorbia penzola, Euforbia carniolica
Genere	<i>Euphorbia</i> L.
Famiglia	Euphorbiaceae Juss.
Ordine	Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Aprile-Giugno
Corologia	SE-Europea
Habitat	Boschi aridi aperti di latifoglie decidue, pinete termofile, dalla fascia submediterranea a quella montana inferiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Euphorbia carniolica Jacq.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpineti
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo umido con buona dotazione in argilla
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 257

Euphorbia dulcis L.

Simonimi	<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman; <i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Rothm.; <i>Euphorbia purpurata</i> Thuill.; <i>Tithymalus dulcis</i> (L.) Scop.; <i>Euphorbia incompta</i> Ces.; <i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Rothm., isonym; <i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Murr.; <i>Galarhoeus dulcis</i> (L.) Haw.; <i>Pythius dulcis</i> (L.) Raf.
Nomi comuni	Euforbia bitorzoluta, Euforbia dolce
Genere	<i>Euphorbia</i> L.
Famiglia	Euphorbiaceae Juss.
Ordine	Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	aprile-luglio
Corologia	Centroeuropea
Habitat	Boschi di latifoglie, siepi, fino alla fascia montana
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Euphorbia dulcis L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo umico con buona dotazione in argilla
Legit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 258

***Festuca trichophylla* (Ducros ex Gaudin)
K.Richt. subsp. *trichophylla***

Sinonimi	<i>Festuca pseudotrichophylla</i> Patzke; <i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>eu-rubra</i> var. <i>trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) Hack.
Nomi comuni	Festuca dei moliniati
Genere	<i>Festuca</i>
Famiglia	Poaceae Barnhart
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Maggio-Agosto
Corologia	Sudeuropea
Habitat	Prati umidi e nelle formazioni a Molinia, su suoli argillosi piuttosto pesanti, dal livello costiero a 1800 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



***Festuca trichophylla* (Ducros ex Gaudin)
K.Richt. subsp. *trichophylla***

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Molinieto
Natura 2000	Habitat 6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Note	-

N. 259

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Sinonimi	<i>Spiraea demodata</i> C. Presl; <i>Spiraea glauca</i> Schultz; <i>Filipendula demodata</i> (J. Presl & C. Presl) Fritsch; <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. subsp. <i>demodata</i> (J. Presl & C. Presl) Hayek; <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. var. <i>nivea</i> Wallr.; <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. var. <i>tomentosa</i> Cambess.
Nomi comuni	Olmarià comune, Filipendula olmaria, Ulmaria comune
Genere	<i>Filipendula</i> L.
Famiglia	Rosaceae Juss.
Ordine	Rosales Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Eurosiberiana
Habitat	Prati umidi, fossati, ruscelletti, paludi e boschi ripariali, dal livello del mare alla fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Luogo di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legitt	Katia Zanatta, 01.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Note	-

N. 260

Genista tinctoria L.

Sinonimi	<i>Genista anxantica</i> Ten.; <i>Genista virgata</i> Willd.; <i>Genista insubrica</i> Brügger; <i>Genista ovata</i> Waldst. & Kit.; <i>Genista tenuifolia</i> Loisel.; <i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>ovata</i> (Waldst. & Kit.) Arcang.; <i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>scariosa</i> sensu Pignatti; <i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tenuifolia</i> (Loisel.) Pignatti
Nomi comuni	Ginestra minore, Ginestra dei tintori, Ginestrella, Bacellina
Genere	<i>Genista</i> L.
Famiglia	Fabaceae Lindl.
Ordine	Fabales Bromhead
Forma biologica	Camefita suffruticosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Boschi aperti di latifoglie decidue, margini di boschi e radure, praterie submesofile e brughiere, su suoli da neutri a subacidi, dal livello del mare alla fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Genista tinctoria L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera interrata
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Suolo torboso
Legit	Katia Zanatta, 07.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 07.06.2023
Note	-

N. 261

Hesperis matronalis L. subsp. *matronalis*

Sinonimi	<i>Hesperis heterophylla</i> Ten.; <i>Hesperis oblongipetala</i> Boiss.; <i>Hesperis sibirica</i> L.
Nomi comuni	Violaciocca antoniana
Genere	<i>Hesperis</i> Pomel
Famiglia	Brassicaceae Burnett
Ordine	Brassicales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Sudeuropea
Habitat	Boschi umidi e fore, radure e margini freschi di boschi decidui, al di sotto della fascia montana inferiore
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Hesperis matronalis L. subsp. *matronalis*

Sito di raccolta	ITALIA, Regione del Friuli Venezia Giulia, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Orlo boschivo
Natura 2000	-
Substrato	Suolo argilloso-torbooso
Legit	Katia Zanatta, 19.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 19.05.2023
Note	-

N. 262

Juncus articulatus L. subsp. *articulatus*

Sinonimi	<i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh.; <i>Juncus gussonei</i> Parl.; <i>Juncus gussonei</i> Parl.
Nomi comuni	Giunco nodoso
Genere	<i>Juncus</i> L.
Famiglia	Juncaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Maggio-Agosto
Corologia	Circumboreale
Habitat	Margini di stagni, abbeveratoi e fossi, su suoli limoso-argillosi costipati, da umidi a inondati, da basico-calcarei a neutro-subacidi, piuttosto ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 1500 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Juncus articulatus L. subsp. *articulatus*

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Note	-

N. 263

Juncus effusus L. subsp. *effusus*

Sinonimi	<i>Juncus fistulosus</i> Guss.; <i>Juncus effusus</i> L. subsp. <i>fistulosus</i> (Guss.) Cif. & Giacom.
Nomi comuni	Giunco comune
Genere	<i>Juncus</i> L.
Famiglia	Juncaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Geofita rizomatosa- Geofita cespitosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Cosmopolita
Habitat	Paludi, lungo le sponde di fiumi e laghi, nei prati umidi, dal livello del mare a 1700 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Juncus effusus L. subsp. *effusus*

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Margine palude
Natura 2000	-
Substrato	Suolo torboso
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 264

Juncus tenuis Willd.

Sinonimi	<i>Juncus macer</i> Gray
Nomi comuni	Giunco americano, Giunco gracile
Genere	<i>Juncus</i> L.
Famiglia	Juncaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Floritura	Giugno-Luglio
Corologia	America del Nord
Habitat	Coltelli, incolti umidi, lungo i sentieri, su terreno pesante e umido, dal livello del mare a 1500 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Neofita invasiva



Juncus tenuis Willd.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Carrareccia con suolo costipato
Natura 2000	-
Substrato	Suolo argilloso
Legis	Katia Zanatta, 16.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 16.06.2023
Note	-

N. 265

Lamium galeobdolon* (L.) L. subsp. *flavidum
(F.Herm.) A.Löve & D.Löve

Sinonimi	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, <i>flavidum</i> (F. Herm.) Ehrend. & Polatschek
Nomi comuni	Ortica mora gialla, Lamio giallo, Falsa ortica
Genere	<i>Lamium</i> L.
Famiglia	Lamiaceae Martinov
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Maggio-Agosto
Corologia	Orofita Sud Europea
Habitat	Ambienti umidi e ombrosi nelle faggete e nei boschi misti di latifoglie decidue, con optimum nella fascia montana.
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Lamium galeobdolon* (L.) L. subsp. *flavidum
(F.Herm.) A.Löve & D.Löve

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Bosco, Querceto-carpineti
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo acido con buona dotazione in argilla
Legit	Katia Zanatta, 19.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 19.05.2023

N. 266

Lathyrus pratensis L. s.l.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Cicerchia de' prati, Cicerchia dei prati
Genere	<i>Lathyrus</i> Mill.
Famiglia	Fabaceae Lindl.
Ordine	Fabales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Maggio-Settembre
Corologia	Paleotemperato
Habitat	Prati da sfalcio mesofili, su suoli limoso-argillosi piuttosto freschi e abbastanza ricchi in composti azotati, dal livello del mare alla fascia montana superiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona





Lathyrus pratensis L. s.l.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Prato da sfalcio
Natura 2000	Habitat 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavii	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 267

Lonicera caprifolium L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Caprifoglio comune, Madreselva comune, Abbracciabosco, Legabosco, Uva di San Giovanni, Manicciola
Genere	<i>Lonicera</i> L.
Famiglia	Caprifoliaceae Juss.
Ordine	Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Fanerofita lianosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Pontica; SE-Europea
Habitat	Macchie, boscaglie, ai margini di boschi di latifoglie decidue (querce e castagneti), al di sotto della fascia montana superiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Lonicera caprifolium L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, quercu-carpineto
Natura 2000	-
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 268

Lonicera xylosteum L.

Sinonimi	<i>Lonicera nigra</i> Loisel., nomina rejecenda
Nomi comuni	Caprifoglio peloso, Madreselva pelosa, Ciliegia di volpe, Pomola del diavolo, Sanguini
Genere	<i>Lonicera</i> L.
Famiglia	Caprifoliaceae Juss.
Ordine	Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Fanerofite cespugliosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Boschi misti aperti di latifoglie decidue, su substrati prevalentemente calcarei, con optimum nella fascia montana inferiore.
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Lonicera xylosteum L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Sotto copertura saliceto a Salice cenerino, interrato
Natura 2000	-
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 05.05.2023
Note	-

N. 269

***Luzula campestris* (L.) DC. subsp.
*campestris***

Sinonimi	-
Nomi comuni	Erba lucciola comune, Lucciola dei campi
Genere	<i>Luzula</i> DC.
Famiglia	Juncaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Aprile-Giugno
Corologia	Circumboreale, Europeo-Caucasica
Habitat	Pascoli e prati magri, su suoli da neutri a subacidi, poveri in composti azotati, da freschi a subaridi, dal livello del mare alla fascia montana superiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



***Luzula campestris* (L.) DC. subsp.
*campestris***

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera interrata
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 270

Luzula pilosa (L.) Willd.

Sinonimi	<i>Juncus pilosus</i> L.; <i>Luzula vernalis</i> DC.
Nomi comuni	Erba lucciola pelosa, Luzola pelosa
Genere	<i>Luzula</i> DC.
Famiglia	Juncaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Circumboreale
Habitat	Faggete e boschi misti di latifoglie decidue su suoli acidi subacidi ricchi in humus, in stazioni ombrose, con optimum nella fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Luzula pilosa (L.) Willd.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiere di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiere di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Querceto-carpinetto di fondovalle
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 22.03.2024
Determinavit	Katia Zanatta, 22.03.2024
Note	-

N. 271

Lycopus europaeus L.

Sinonimi	<i>Lycopus europaeus</i> L. subsp. <i>mollis</i> (A. Kern.) Rothm. ex Skalický; <i>Lycopus menthifolius</i> Mabilley; <i>Lycopus europaeus</i> L. subsp. <i>menthaefolius</i> (Mabilley) Skalický
Nomi comuni	Erba-sega comune, Marrubio d'acqua, Piede di lupo, Licopo europeo
Genere	<i>Lycopus</i> L.
Famiglia	Lamiaceae Martinov
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofite scapose, Idrofite radicante
Floritura	Giugno-Settembre
Corologia	Circumboreale, Paleotemperato
Habitat	Luoghi umidi, margini di stagni, fossati e corsi d'acqua, su suoli da argillosi a torbosi periodicamente inondati e ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 1100 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Lycopus europaeus L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476,5102341 / 46° 2'11"N 11° 57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera interrata
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 272

Lysimachia vulgaris L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Mazza d'oro comune, Lisimachia
Genere	<i>Lysimachia</i> L.
Famiglia	Primulaceae Batsch ex Borkh.
Ordine	Ericales Bercht. & J. Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Giugno-Agosto
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Luoghi umidi, margini di stagni e fossati, su suoli da argillosi a torbosi, periodicamente inondati, dal livello del mare alla fascia montana inferiore
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Lysimachia vulgaris L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 12.08.2022
Determinavit	Katia Zanatta, 12.08.2022
Note	-

N. 273

Lythrum salicaria L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	-
Genere	<i>Lythrum</i> L.
Famiglia	Lythraceae J.St.-Hil.
Ordine	Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa; Elofita
Fioritura	Giugno-Settembre
Corologia	Subcosmopolita
Habitat	Luoghi umidi, margini di stagni e fossati, su suoli da argillosi a torbosi periodicamente inondati, ricchi in composti azotati, subneutri e a volte anche subsalsi, dal livello del mare a 1200 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Lythrum salicaria L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Note	-

N. 274

Melica nutans L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Melica delle faggete, Melica pendente
Genere	<i>Melica</i> L.
Famiglia	Poaceae Barnhart
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Maggio-Giugno
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Boschi maturi da subaridi a freschi con <i>coetum</i> nella fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Melica nutans L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpineti
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 17.04.2023
Note	-

N. 275

Melittis melissophyllum L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Erba limona comune, Bocca di lupo
Genere	<i>Melittis</i> L.
Famiglia	Lamiaceae Martinov
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Maggio-Agosto
Corologia	Centroeuropea
Habitat	Boschi aperti e boscaglie dominate da latifoglie decidue, da livello del mare alla fascia montana inferiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Melittis melissophyllum L.

Località	Monte Pelicciolo, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiere di Lipoi
Area protetta	Parco Naturale della Torbiere di Lipoi (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpineti
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo umico con buona dotazione in argilla
Legitt.	Katia Zanatta, 19.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 19.05.2023
Note	-

N. 276

Mentha aquatica L. subsp. *aquatica*

Sinonimi	<i>Mentha aquatica</i> L. subsp. <i>ortmanniana</i> (Opiz) Lemke
Nomi comuni	Menta d'acqua, Menta acquatica
Genere	<i>Mentha</i> L.
Famiglia	Lamiaceae Martinov
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Giugno-Ottobre
Corologia	Paleotemperata; Subcosmopolita
Habitat	Vegetazioni palustri lungo fossati, stagni e corsi d'acqua, su suoli limosi periodicamente inondati, ricchi in basi, al livello del mare a 1200 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Mentha aquatica L. subsp. *aquatica*

Luogo di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Note	-

N. 277

Molinia caerulea (L.) Moench

Sinonimi	<i>Aira caerulea</i> L.; <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench; <i>Aira caerulea</i> L.
Nomi comuni	Gramigna liscia, Molinia cerulea
Genere	<i>Molinia</i> Schrank
Famiglia	Poaceae Barnhart
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Luglio-Settembre
Corologia	Circumboreale
Habitat	Prati umidi, torbiere e paludi, su suoli argillosi piuttosto profondi, poveri in calcio, costipati e ad alta ritenzione idrica, da neutri a subacidi, sino alla fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Molinia caerulea (L.) Moench

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Molinieto
Natura 2000	Habitat 6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinia caerulea</i>)
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 01.06.2023
Note	-

N. 278

Paris quadrifolia L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Uva di volpe
Genere	<i>Paris</i> L.
Famiglia	Melanthiaceae Batsch ex Borkh.
Ordine	Liliales Perleb
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Floritura	Maggio-Agosto
Corologia	Eurasiatica
Habitat	Boschi umidi di latifoglie decidue e di conifere, in posizioni ombreggiate, su suoli freschi e umici
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Paris quadrifolia L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpineto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso-umifero
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 279

Persicaria mitis (Schränk.) Assenov

Sinonimi	<i>Polygonum mite</i> Schrank; <i>Polygonum dubium</i> Stein; <i>Persicaria dubia</i> (Stein.) Fourr.
Nomi comuni	Poligono mite
Genere	<i>Persicaria</i> (L.) Mill.
Famiglia	Polygonaceae Juss.
Ordine	Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Forma biologica	Terofita scaposa
Fioritura	Luglio-Ottobre
Corologia	Europeo-Caucasica
Habitat	Vegetazioni umide e più o meno disturbate, lungo i fossi, ai margini di stagni e viottoli boschivi umidi, su suoli limoso-argillosi ricchi in composti azotati, dal livello del mare alla fascia montana inferiore
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Persicaria mitis (Schränk.) Assenov

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 15.09.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 15.09.2023
Note	-

N. 280

Phalaris arundinacea* L. subsp. *arundinacea

Sinonimi	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert; <i>Typhoides arundinacea</i> (L.) Moench
Nomi comuni	Scagliola palustre
Genere	<i>Phalaris</i> L.
Famiglia	Poaceae Barnhart
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Elofita
Fioritura	Maggio-Luglio
Corologia	Circumboreale
Habitat	Sponde di laghi e fiumi, canali, fossi e stagni, dal livello del mare a 1600 m circa
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Phalaris arundinacea* L. subsp. *arundinacea

Luogo di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT30042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.2 102541 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Sponda di canale
Natura 2000	-
Substrato	Suolo argilloso
Legitt	Katia Zanatta, 10.07.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 10.07.2023
Note	-

N. 281

Plantago altissima L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Piantaggine palustre
Genere	<i>Plantago</i> L.
Famiglia	Plantaginaceae Juss.
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Emicriptofita rosulata
Floritura	Maggio-Ottobre
Corologia	SE-Europea
Habitat	Prati umidi, spesso anche in ambienti salmastri lungo le coste, al di sotto della fascia montana inferiore
	Non protetta a livello nazionale
	Autoctona




Plantago altissima L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiere di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiere di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiere, prato umido
Natura 2000	Habitat 6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
Substrato	Suolo torboso-argilloso
Legit	Katia Zanatta, 12.08.2022
Determinavit	Katia Zanatta, 12.08.2022
Note	-

N. 282

Rhamnus cathartica L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Spinocervino, Ramno purgativo
Genere	<i>Rhamnus</i> L.
Famiglia	Rhamnaceae Juss.
Ordine	Rosales Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Fanerofita cespitosa
Fioritura	Aprile-Giugno
Corologia	Pontica; Sudeuropea
Habitat	Boschi submesofili di latifoglie decidue e ai loro margini, su suoli argillosi, umiferi, neutri, piuttosto ricchi in basi, da freschi a subaridi, dal livello del mare alla fascia montana inferiore
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Rhamnus cathartica L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera, prato umido
Natura 2000	Habitat 6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 10.07.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 10.07.2023
Note	-

N. 283

Rhinanthus freynii (Sterneck) A.Kern. ex Fiori

Sinonimi	<i>Alectorolophus freynii</i> Sterneck; <i>Alectorolophus freynii</i> A. Kern.; <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>freynii</i> (Sterneck) Hartl; <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich var. <i>freynii</i> (Sterneck) Chabert; <i>Rhinanthus freynii</i> (Sterneck) Fiori
Nomi comuni	Cresta di gallo di Freyn
Genere	<i>Rhinanthus</i> L.
Famiglia	Orobanchaceae Vent.
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Terofita scaposa
Fioritura	Giugno-Luglio
Corologia	Endemica alpica
Habitat	Prati aridi seminaturali e prati da sfalcio, su suoli argillosi calcarei ma spesso decalcificati, quindi neutro-basici, piuttosto ricchi in composti azotati, dal livello del mare alla fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona



Rhinanthus freynii (Sterneck) A.Kern. ex Fiori

Sito di raccolta	ITALIA - Veneto, Torbiera di Lipoi, Comune di Feltre:
Area protetta	6510 43230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	46° 21' 11" N 11° 57' 9" E
Altitudine	6510 m s.l.m.
Prato da sfalcio	
Habitat 6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
Substrato	Suolo argilloso
Legit	Katia Zanatta, 16.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 16.06.2023
Note	-

N. 284

Schoenus nigricans L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Giunco nero comune
Genere	<i>Schoenus</i> L.
Famiglia	Cyperaceae Juss.
Ordine	Poales Small
Forma biologica	Emicriptofita cespitosa
Fioritura	Aprile-Luglio
Comologia	Subcosmopolita
Habitat	Prati umidi torbosi e in torbiere basse, anche in ambienti retrodunali e in ambienti asciutti per un certo tempo
Protezione	Entità protetta a livello regionale
Esoticità	Autoctona




Schoenus nigricans L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 (IT3230042)
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	300 m s.l.m.
Habitat	Torbiera
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 19.05.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 19.05.2023
Note	-

N. 285

Scutellaria galericulata L.

Sinonimi	-
Nomi comuni	Scutellaria palustre
Genere	<i>Scutellaria</i> L.
Famiglia	Lamiaceae Martinov
Ordine	Lamiales Bromhead
Forma biologica	Geofita rizomatosa
Fioritura	Giugno-Agosto
Corologia	Circumboreale
Habitat	Rive di corsi d'acqua, prati umidi, boschi acquitrinosi, su suoli prevalentemente alcalini, al di sotto della fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Scutellaria galericulata L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Torbiera, moliniato
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legis	Katia Zanatta, 08.06.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Note	-

N. 286

***Symphyotrichum lanceolatum* (Willd.)
G.L.Nesom**

Sinonimi	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.; <i>Aster tradescantii</i> Auct. non L.; <i>Aster tradescantii</i> auct. p.p., non L.; <i>Symphyotrichum tradescantii</i> auct. p.p., non (L.) G.L. Nesom; <i>Aster hesperius</i> A. Gray; <i>Aster simplex</i> Willd.
Nomi comuni	Astro di Tradescant, Astro lanceolato
Genere	<i>Symphyotrichum</i> Nees
Famiglia	Asteraceae Bercht. & J.Presl
Ordine	Asterales Link
Forma biologica	Emicriptofite scapose
Fioritura	Agosto-Ottobre
Corologia	America del Nord
Habitat	Ambienti disturbati, su suoli piuttosto umidi, aree nitride, lungo i sentieri e presso le case
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Neofita invasiva



***Symphyotrichum lanceolatum* (Willd.)
G.L.Nesom**

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Substrato	Suolo argilloso-torboso
Legit	Katia Zanatta, 31.08.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 31.08.2023
Note	

N. 287

***Taraxacum sect. Palustria* (H.Lindb.)
Dahlst.**

Sinonimi	<i>Taraxacum</i> [unranked] <i>Palustria</i> H.Lindb.; <i>Taraxacum palustre</i> auct.
Nomi comuni	Tarassaco palustre
Genere	<i>Taraxacum</i> F.H. Wigg.
Famiglia	Asteraceae Bercht. & J.Presl
Ordine	Asterales Link
Forma biologica	Emicriptofita rosulata
Fioritura	Aprile-Maggio
Corologia	Agg. specie Europee
Habitat	Vegetazioni pioniere umide ai margini di fossi e stagni e in siti con ristagno d'acqua, su suoli limoso-argillosi neutri, alternativamente inondati e aridi, dal livello del mare a 1000 m circa, a volte anche più in alto
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




***Taraxacum sect. Palustria* (H.Lindb.)
Dahlst.**

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Sentiero, capezzagna
Natura 2000	
Substrato	Suolo argilloso
Legitt.	Katia Zanatta, 22.03.2024
Determinavit	Katia Zanatta, 22.03.2024
Note	-

N. 288

Valeriana dioica L.

Sinonimi	<i>Valeriana simplicifolia</i> Kabath
Nomi comuni	Valeriana palustre
Genere	<i>Valeriana</i> L.
Famiglia	Caprifoliaceae Juss.
Ordine	Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Aprile-Luglio
Corologia	Europea; Subatlantica
Habitat	Ambienti umidi, soprattutto in paludi piuttosto acide, dal livello del mare alla fascia montana
Protezione	Entità protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




Valeriana dioica L.

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre; Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Palude, ontaneta
Natura 2000	Habitat 91E0* : Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
Substrato	Suolo con ristagno d'acqua
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 289

***Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau**

Sinonimi	<i>Viola sylvestris</i> Lam. p.p.
Nomi comuni	Viola silvestre, Viola di Reichenbach
Genere	<i>Viola</i> L.
Famiglia	Violaceae Batsch
Ordine	Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Forma biologica	Emicriptofita scaposa
Fioritura	Marzo-Luglio
Corologia	Europea; Eurosiberiana
Habitat	Boschi maturi di latifoglie decidue, parchi e aiuole ombrose, su suoli argillosi freschi, profondi e umiferi, piuttosto ricchi in composti azotati, da neutri a subacidi, dal livello del mare a 1700 m circa
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Autoctona




***Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau**

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Bosco, querceto-carpinetto
Natura 2000	Habitat 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
Substrato	Suolo argilloso-umifero
Legit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 28.04.2023
Note	-

N. 290

***Willemetia stipitata* (Jacq.) Dalla Torre
subsp. *stipitata***

Sinonimi	<i>Hieracium stipitatus</i> Jacq.; <i>Willemetia apargioides</i> Rehb., nom. illeg., incl. in; <i>Willemetia hieracioides</i> Monnier, incl. in; <i>Chondrilla peltidium</i> Moritzzi, nom. illeg.; <i>Chondrilla stipitata</i> (Jacq.) Sch. Bip.; <i>Willemetia hieracioides</i> Neck., nom. illeg.; <i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Cass.; <i>Hieracium stipitatum</i> Jacq.; <i>Calyocorsus stipitatus</i> (Jacq.) Rauschert
Nomi comuni	Lattugaccio palustre
Genere	<i>Willemetia</i> Neck.
Famiglia	Asteraceae Bercht. & J.Presl
Ordine	Asterales Link
Forma biologica	Emicriptofita rosulata
Fioritura	Luglio-Agosto
Corologia	Orofita Sud Europea
Habitat	Paludi e torbiere basse, su suoli subacidi ricchi in sostanza organica, di preferenza in aree con substrati silicei, dalla fascia montana superiore a quella alpina
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Autocità	Autoctona




***Willemetia stipitata* (Jacq.) Dalla Torre
subsp. *stipitata***

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre, Via Valle di Lamen
Area protetta	
Altitudine	737 m s.l.m.
Habitat	Torbiere
Natura 2000	Habitat 7230: Torbiere basse alcaline
Substrato	Torba
Legit	Katia Zanatta, 08.06.2023
Descrivere	Katia Zanatta, 08.06.2023
Note	Torbiere pascolata

N. 291

***Symphotrichum lanceolatum* (Willd.)
G.L.Nesom**

Sinonimi	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.; <i>Aster tradescantii</i> (L.) non L.; <i>Aster tradescantii</i> auct. p.p., non L.; <i>Symphotrichum tradescantii</i> auct. p.p., non L.; G.L. Nesom; <i>Aster simplex</i> Willd.
Nome comuni	Astro di Tradescant, Astro lanceolato
Genere	<i>Symphotrichum</i> Nees
Famiglia	Asteraceae Bercht. & J.Presl
Ordine	Asterales Link
Forma biologica	Emicriptofite scapose
Fioritura	Agosto-Ottobre
Corologia	America del Nord
Habitat	Ambienti disturbati, su suoli piuttosto umidi, a vegetazione lungo i sentieri e presso le case
Protezione	Non protetta a livello nazionale
Esoticità	Neofita invasiva



***Symphotrichum lanceolatum* (Willd.)
G.L.Nesom**

Sito di raccolta	ITALIA, Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Feltre: Torbiera di Lipoi
Area protetta	Rete Natura 2000 - ZSC IT3230042 Torbiera di Lipoi
Coordinate	UTM WGS84 32T 728476.5102341 / 46° 2'11"N 11°57'9"E
Altitudine	311 m s.l.m.
Habitat	Megaforbieto
Natura 2000	Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Substrato	Suolo argilloso-torboso
Legit	Katia Zanatta, 31.08.2023
Determinavit	Katia Zanatta, 31.08.2023
Note	